

## GRADACIÓN TC DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

	Scores			
	0	1	2	3
<b>Severidad bronquiectasias</b>	Ausente	Discreta ( $\emptyset$ luminal algo mayor que el $\emptyset$ del vaso adyacente)	Moderada ( $\emptyset$ luminal 2-3 veces el $\emptyset$ del vaso adyacente)	Severa ( $\emptyset$ luminal >3 veces el $\emptyset$ del vaso adyacente)
<b>Engrosamiento peribronquial</b>	Ausente	Discreto (grosor de la pared igual que el $\emptyset$ del vaso adyacente)	Moderado (grosor de la pared mayor, hasta el doble, que el $\emptyset$ del vaso adyacente)	Severo (grosor de la pared >2 veces el $\emptyset$ del vaso adyacente)
<b>Extensión bronquiectasias (nº segmentos)</b>	Ausente	1-5	6-9	>9
<b>Extensión tapones moco (nº segmentos)</b>	Ausente	1-5	6-9	>9
<b>Saculaciones o abscesos (nº segmentos)</b>	Ausente	1-5	6-9	>9
<b>Generaciones bronquiales afectas</b>	Ausente	Hasta la 4ª generación	Hasta la 5ª generación	Hasta la 6ª generación y distal
<b>Número de bullas</b>	Ausente	Unilateral ( $\leq 4$ )	Bilateral ( $\leq 4$ )	>4
<b>Enfisema (nº segmentos)</b>	Ausente	1-5	>5	
<b>Colapso / consolidación</b>	Ausente	Subsegmentario	Segmentario / lobar	

Nota: Calcular la puntuación según los datos de esta tabla. Añadir la letra *P* para los tapones de moco y *T* para el engrosamiento peribronquial cuando los haya.

Bhalla M, Turcios N, Aponte V, Jenkins M, Leitman BS, McCauley DI, et al. Cystic Fibrosis: Scoring System with Thin-Section CT. Radiology. 1991;179:783-8.